

## 4. přednáška

Rostislav Horčík

23. října 2006

### 1 Lineární obaly, báze a dimenze

**Definice 1** *Nechť  $L$  je lineární prostor. Neprázdná konečná množina  $K \subseteq L$ ,  $K = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$  se nazývá LZ, pokud je LZ konečná posloupnost  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ . Nekonečná množina  $M \subseteq L$  se nazývá LZ, pokud existuje konečná  $K \subseteq M$ , která je LZ. Množina, která není LZ je LN ( $\emptyset$  je LN).*

Konečná množina  $K = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$  je tedy LN, pokud je LN konečná posloupnost  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$  a nekonečná množina  $M$  je LN, pokud každá její konečná podmnožina je LN.

**Příklad** Množina  $M = \{1, x, x^2, x^3, \dots\}$  je nekonečná LN podmnožina lineárního prostoru všech polynomů, protože libovolná konečná podmnožina je LN. Skutečně, mějme libovolnou  $K = \{x^{k_1}, x^{k_2}, \dots, x^{k_n}\}$ . Pak

$$\alpha_1 x^{k_1} + \alpha_2 x^{k_2} + \dots + \alpha_n x^{k_n} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

je splněno jen pro  $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ , protože jediné polynom se samými nulovými koeficienty je roven nulovému polynomu.

**Definice 2** *Nechť  $L$  je lin. prostor a  $M \subseteq L$ . Lineární obal  $\langle M \rangle$  je množina všech lineárních kombinací prvků z  $M$ , tj.*

$$\langle M \rangle = \{\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{x}_n \mid n \in \mathbb{N}, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in M, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}\}.$$

Vektor  $\mathbf{z}$  patří tedy do lineárního obalu  $\langle M \rangle$ , pokud existuje  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in M$  a  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$  t.ž.

$$\mathbf{z} = \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{x}_n.$$

#### Příklad

$$\langle (1, 5, 3), (-2, 0, 4) \rangle = \{\alpha_1(1, 5, 3) + \alpha_2(-2, 0, 4) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\} = \{(\alpha_1 - 2\alpha_2, 5\alpha_1, 3\alpha_1 + 4\alpha_2) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$$

$$\langle 1, x, x^2, x^3, \dots \rangle = \mathbb{R}[x]$$

**Věta 1** *Nechť  $L$  je lin. prostor a  $M \subseteq L$ . Pak  $\langle M \rangle$  je nejmenší lin. podprostor prostoru  $L$ , který obsahuje  $M$ .*

DŮKAZ: Necht'  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \langle M \rangle$  a  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Pak

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{u}_n \\ \mathbf{y} &= \beta_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \beta_m \mathbf{v}_m\end{aligned}$$

pro nějaké  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in M$ . Máme tedy

$$\begin{aligned}\mathbf{x} + \mathbf{y} &= \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{u}_n + \beta_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \beta_m \mathbf{v}_m \\ \alpha \mathbf{x} &= (\alpha \alpha_1) \mathbf{u}_1 + \cdots + (\alpha \alpha_n) \mathbf{u}_n\end{aligned}$$

Takže  $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in \langle M \rangle$  a  $\alpha \mathbf{x} \in \langle M \rangle$ .

Zřejmě  $M \subseteq \langle M \rangle$ . Necht'  $U$  je lin. podprostor  $L$  a  $M \subseteq U$ . Ukážeme, že  $\langle M \rangle \subseteq U$ . Mějme  $\mathbf{z} \in \langle M \rangle$ , t.j.

$$\mathbf{z} = \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \alpha_n \mathbf{x}_n,$$

pro nějaké  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in M$  a  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ . Protože každé  $\mathbf{x}_i \in U$  a  $U$  je podprostor, musí  $\alpha_i \mathbf{x}_i \in U$ . Tudíž i součet  $\mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{x}_i \in U$ .  $\square$

**Věta 2** Necht'  $L$  je lin. prostor,  $M \subseteq L$  a  $\mathbf{z} \in L$ . Je-li  $\mathbf{z} \in \langle M \rangle$ , pak  $\langle M \rangle = \langle M \cup \{\mathbf{z}\} \rangle$ .

DŮKAZ: Zřejmě  $\langle M \rangle \subseteq \langle M \cup \{\mathbf{z}\} \rangle$ . Protože  $M \subseteq \langle M \rangle$  a  $\{\mathbf{z}\} \subseteq \langle M \rangle$ , máme  $M \cup \{\mathbf{z}\} \subseteq \langle M \rangle$ . Tudíž  $\langle M \cup \{\mathbf{z}\} \rangle \subseteq \langle \langle M \rangle \rangle = \langle M \rangle$ .  $\square$

**Věta 3** Necht'  $L$  je lineární prostor,  $M \subseteq L$  je LN množina a  $\mathbf{z} \notin \langle M \rangle$ . Pak též  $M \cup \{\mathbf{z}\}$  je LN množina.

DŮKAZ: Sporem. Předpokládejme, že  $M \cup \{\mathbf{z}\}$  je LZ. Pak existují  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in M$  a reálná čísla  $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1} \in \mathbb{R}$  (alespoň jedno nenulové) t.ž.

$$\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{x}_n + \alpha_{n+1} \mathbf{z} = \mathbf{o}.$$

Číslo  $\alpha_{n+1}$  nemůže být 0, protože jinak by  $M$  byla LZ. Tudíž

$$\mathbf{z} = -\frac{\alpha_1}{\alpha_{n+1}} \mathbf{x}_1 - \cdots - \frac{\alpha_n}{\alpha_{n+1}} \mathbf{x}_n.$$

Tedy  $\mathbf{z} \in \langle M \rangle$  (spor).  $\square$

**Definice 3** Necht'  $L$  je lin. prostor a  $B \subseteq L$ .  $B$  se nazývá báze lin. prostoru  $L$ , pokud

1.  $B$  je LN,
2.  $\langle B \rangle = L$ ,

**Příklad**  $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$  je báze lin. prostoru  $\mathbb{R}[x]$ .  $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$  je báze  $\mathbb{R}^3$ . Obecně množina uspořádaných  $n$ -tic

$$\{(1, 0, \dots, 0, 0), (0, 1, \dots, 0, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1, 0), (0, 0, \dots, 0, 1)\}$$

je báze  $\mathbb{R}^n$ , které se říká standardní.

**Věta 4** *Nechť  $L$  je netriviální lin. prostor. Pak*

1. *Pro každou LN množinu  $N \subseteq L$  existuje báze  $B$  lin. prostoru  $L$  t.ž.  $N \subseteq B$ .*
2. *Pro každou množinu  $M \subseteq L$  t.ž.  $\langle M \rangle = L$ , existuje báze  $B$  lin. prostoru  $L$  t.ž.  $B \subseteq M$ .*

**Věta 5 (Steinitzova o výměně)** *Nechť  $L$  je lin. prostor,  $M \subseteq L$ , a  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq \langle M \rangle$  je LN množina. Pak  $\exists$  navzájem různé  $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k \in M$  t.ž.*

$$\langle M \rangle = \langle \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \cup (M \setminus \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}) \rangle.$$

DŮKAZ: Indukcí podle  $k$ . Pro  $k = 0$  triviální, protože v množině  $M$  nic nenahrazujeme. Předpokládejme, že věta platí pro  $k \geq 0$  a ukážeme, že platí i pro  $k+1$ . Nechť  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}\} \subseteq \langle M \rangle$ . Pak z indukčního předpokladu existují  $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k \in M$  t.ž.

$$\langle M \rangle = \langle \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \cup (M \setminus \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}) \rangle.$$

Označme  $M \setminus \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\} = M'$ . Tedy

$$\langle M \rangle = \langle \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \cup M' \rangle = \langle \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}\} \cup M' \rangle.$$

Druhá rovnost platí, protože  $\mathbf{v}_{k+1} \in \langle M \rangle$ . Protože  $\mathbf{v}_{k+1} \in \langle \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \cup M' \rangle$  máme

$$\mathbf{v}_{k+1} = \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{x}_n + \beta_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \beta_k \mathbf{v}_k,$$

pro nějaké  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in M'$  a  $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{R}$ . Protože  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}\}$  je LN, musí být alespoň jedno  $\alpha_i \neq 0$ . Bez újmy na obecnosti nechť  $\alpha_1 \neq 0$ . Pak

$$\mathbf{x}_1 = \frac{1}{\alpha_1} \mathbf{v}_{k+1} - \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \mathbf{x}_2 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_1} \mathbf{x}_n - \frac{\beta_1}{\alpha_1} \mathbf{v}_1 - \dots - \frac{\beta_k}{\alpha_1} \mathbf{v}_k.$$

Tj.

$$\mathbf{x}_1 \in \langle \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}\} \cup (M' \setminus \{\mathbf{x}_1\}) \rangle.$$

To ale podle Věty 2 znamená, že

$$\langle \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}\} \cup (M' \setminus \{\mathbf{x}_1\}) \rangle = \langle \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}\} \cup M' \rangle = \langle M \rangle$$

□

Značení: nechť  $M$  je množina, pak  $|M|$  je počet jejích prvků pokud je konečná a jinak  $|M| = \infty$ .

**Důsledek 1** *Nechť  $L$  je lin. prostor,  $M \subseteq L$  a  $N \subseteq \langle M \rangle$  je LN množina. Pak  $|N| \leq |M|$ .*

DŮKAZ: Pokud  $|M| = \infty$  pak je to triviální. Pokud  $|M| = n$  a  $|N| > n$ . Pak podle Steinitzovy věty lze vzít libovolnou  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n+1}\} \subseteq N$  a nahradit jimi  $n+1$  navzájem různých prvků z  $M$ . To ale nejde, protože  $|M| = n$ . □

**Věta 6** *Nechť  $L$  je lin. prostor a  $B_1, B_2$  jsou jeho báze. Pak  $|B_1| = |B_2|$ .*

DŮKAZ: Protože  $B_1 \subseteq \langle B_2 \rangle$  máme  $|B_1| \leq |B_2|$ . Podobně  $B_2 \subseteq \langle B_1 \rangle$  implikuje  $|B_2| \leq |B_1|$ . Takže  $|B_1| = |B_2|$ .  $\square$

**Definice 4** Nechť  $L$  je lin. prostor a  $B$  je báze. Pak dimenze  $L$  je počet prvků  $B$ , tj.  $\dim L = |B|$ .

**Věta 7** Nechť  $L$  je lin. prostor a  $M \subseteq L$  je jeho podprostor. Pak  $\dim M \leq \dim L$ .

DŮKAZ: Nechť  $B_1$  je báze  $M$  a  $B_2$  je báze  $L$ . Protože  $B_1$  je LN a  $B_1 \subseteq \langle B_2 \rangle$ , máme  $\dim M = |B_1| \leq |B_2| = \dim L$ .  $\square$

**Věta 8** Nechť  $L$  je lin. prostor,  $\dim L = n$ ,  $M \subseteq L$  a  $|M| = m$ . Pak platí:

1. Pokud  $M$  je LN, pak  $m \leq n$ .
2. Je-li  $m > n$ , pak  $M$  je LZ.
3. Je-li  $m = n$ . Pak  $M$  je LN p.t.k.  $\langle M \rangle = L$ .

DŮKAZ:

1. Nechť  $B$  je báze  $L$ . Protože  $M \subseteq \langle B \rangle$ , je  $m = |M| \leq |B| = n$ .
2. Je ekvivalentní s předchozím bodem.
3.  $(\Rightarrow)$  Nechť  $M$  je LN. Pokud  $\langle M \rangle \neq L$  pak  $M \cup \{z\}$  je LN pro nějaký  $z \notin \langle M \rangle$ . To je ale spor s 1. tvrzením, protože  $|M \cup \{z\}| = n + 1 > n$ . Tudíž  $\langle M \rangle = L$ .  
 $(\Leftarrow)$  Pokud  $\langle M \rangle = L$  a  $M$  je LZ. Pak existuje báze  $B \subseteq M$  a  $|B| < |M| = n$ . To je ale spor, protože všechny báze mají stejný počet prvků.

Pozn.:  $M$  tedy musí být báze  $L$ .

$\square$

## 2 Souřadnice v uspořádané bázi

**Definice 5** Nechť  $(B) = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$  je uspořádaná báze lin. prostoru  $L$  a  $\mathbf{x} \in L$ . Uspořádanou  $n$ -tici reálných čísel  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  nazýváme souřadnicemi vektoru  $\mathbf{x}$  vzhledem k uspořádané bázi  $(B)$ , pokud platí

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{b}_1 + \alpha_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{b}_n.$$

Tuto skutečnost zapisujeme zkráceně takto:

$$\mathbf{x} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_{(B)}.$$

**Věta 9** Nechť  $(B) = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$  je uspořádaná báze lin. prostoru  $L$ . Pak pro každý  $\mathbf{x} \in L$  souřadnice  $\mathbf{x}$  vzhledem k bázi  $(B)$  existují a jsou určeny jednoznačně.

DŮKAZ: Existence: každý  $\mathbf{x} \in L$  lze vyjádřit jako lin. kombinaci bázevých prvků.

Jednoznačnost sporem: necht' existují  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbb{R}^n$  a  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq (\beta_1, \dots, \beta_n)$ . Pak

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{b}_n = \beta_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \beta_n \mathbf{b}_n.$$

$$(\alpha_1 - \beta_1) \mathbf{b}_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n) \mathbf{b}_n = \mathbf{o}.$$

Protože  $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$  je LN, máme  $\alpha_i - \beta_i = 0$ . To ale znamená, že  $\alpha_i = \beta_i$  (spor).  $\square$

**Příklad**  $(B) = (1, x, x^2)$  je usp. báze lin. prostoru polynomů stupně nejvýše 2. Polynom  $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$  má v této bázi souřadnice  $(5, -3, 2)$ , t.j.  $f(x) = 5 \cdot 1 + (-3) \cdot x + 2 \cdot x^2$ .